

マグコロール散 100g を服用される方へ

<QRコードから動画をご覧ください>



溶かし方


水を入れる前に容器の折り目をのばし、底を広げてください。

①



キャップを開け、500の目盛りまで水を入れてください。

②



水を入れたらすぐにキャップを閉め、左右によく振って粉末を十分に溶かしてください。

③



1800の目盛りまで水を追加し、軽く振り混ぜてください。

※平らな場所で、1800の目盛りまで水が入っていることを確認してください。

飲み方

○全量を1時間くらいかけてコップ1杯（約200mL）ずつゆっくり服用してください。

○ご高齢の方はとくに時間をかけて服用してください。

○ひとりでは服用しないでください。

※飲み始めて約1時間後に1回目の排便があります。

※排便は5～8回つづきます。

※排便回数とともに、便の性状は固形・泥状便・水様便に変化します。

うすい黄色の透明な状態（便の性状⑤）になったら大腸の中はきれいになっています。

※うすい黄色の透明な状態にならなかった場合は、検査の前に申し出てください。



<便の性状>



固形・泥状便



水様便



透明

<注意>このような方は連絡してください

○マグコロール散の服用前日と服用前いずれも排便がない方。

（服用しないで連絡してください）

○マグコロール散を全量服用後、排便がない方。

○マグコロール散の服用中または服用後に次の症状があらわれた方。

✓おなかが痛い

✓吐き気がする

✓吐いた

✓血便が出た

✓気分がわるい

✓からだがだるい

✓うとうとする

✓皮膚が赤くなる

✓じんましんが出た など